Control biológico en Almería: más de 26.000 hectáreas

COEXPHAL anima a los agricultores a intensificar el control biológico en cultivos de primavera, y continuar con la tendencia alcista en Almería, que ya cuenta con 26.035 hectáreas de invernaderos bajo estas técnicas de control de plagas y enfermedades.

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPHAL, ha instado a los agricultores y asociados a continuar **fomentando y aplicando las técnicas de control biológico en los cultivos de primavera**, que tienen unos ciclos más cortos, aunque siguen siendo objeto de ataques de plagas y enfermedades.

Desde COEXPHAL se considera vital seguir **manteniendo la tendencia creciente del uso de insectos beneficiosos y soluciones naturales** en los cultivos de invernadero, cuya implantación supone ya **el 80,6% de la superficie invernada hasta alcanzar las 26.035 hectáreas**, según los datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

El Pimiento, todo un ejemplo en control biológico

El paradigma del control biológico se refleja **en los cultivos de pimiento hasta alcanzar el 100% de la superficie**, con 11.500 hectáreas declaradas, o el alto porcentaje (85%) en el cultivo de tomate, y en pepino y berenjena en torno al 70% de la superficie.

Sin embargo, **en cultivos de ciclo corto como el melón o la sandía, o en otra cucurbitácea como el calabacín, el control biológico baja hasta porcentajes del 30%**, por lo que desde COEXPHAL recomiendan continuar usando insectos auxiliares ya que de esta forma no se perderá el trabajo realizado en el anterior cultivo y se prepara mejor la finca de cara a los futuros cultivos de invierno.

Jan van der Blom, responsable del Departamento de Técnicas de Producción de COEXPHAL, entomólogo y uno de los grandes expertos en control biológico, asegura que "**los resultados del control biológico en los cultivos de primavera son rotundamente buenos**. Además, si se finalizan los cultivos de una finca con muchos insectos auxiliares y muy pocas plagas, se presta un servicio muy importante al entorno, a los vecinos y al propio agricultor, ya que se genera fauna auxiliar que actúa también después de finalizados los cultivos de primavera, es decir, en el próximo cultivo".

Por esta razón, desde COEXPHAL recuerdan a sus asociados mantener el control biológico en los cultivos de primavera. "Además de combatir las plagas como el pulgón, la mosca blanca o trips de forma eficaz, bajo las certificaciones estipuladas, se refuerza la calidad de nuestros productos y su imagen ante los mercados, con un campo más limpio y una producción sostenible", ha remarcado Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL.